

Ο.Κ.Α.Ε.



ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Απόφ. Πρωτ.Αθηνών 786/2013

Αρ. Περιφ. Αττικής 19698

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για το **ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ** της **ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ**

(Patellar Luxation)

Ο Ο.ΚΑ.Ε προτείνει:

1. Να μην αναπαράγεται κανένα θηλυκό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 18 μηνών και κανένα αρσενικό Κάβαλιερ σε ηλικία μικρότερη των 16 μηνών.
2. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ μεγαλύτερο των 8 ετών.
3. Να εξετάζεται κλινικά σε ετήσια βάση αρχής γινόμενης των 12 μηνών κάθε Κάβαλιερ για την πιθανή εμφάνιση εξαρθήματος επιγονατίδας.
4. Να εξετάζεται κλινικά κάθε Κάβαλιερ για την πιθανή εμφάνιση εξαρθήματος επιγονατίδας πριν από κάθε αναπαραγωγή.
5. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ στο οποίο διαγνώστηκε εξάρθημα επιγονατίδας.
6. Να μην αναπαράγεται κανένα Κάβαλιερ, του οποίου ο ένας τουλάχιστον γονέας πάσχει από εξάρθημα επιγονατίδας.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

Στάδιο 1

Η επιγονατίδα είναι σχεδόν φυσιολογική και εξαρθρώνεται μονάχα στην υπερέκταση του γονάτου.

Στάδιο 2

Η επιγονατίδα εξαρθρώνεται με κλινική εμφάνιση χωλότητας συνήθως χωρίς πόνο και με δυνατότητα αυτόματης ανάταξης.

Στάδιο 3

Η επιγονατίδα έχει εξαρθρωθεί περισσότερες από μια φορές.

Ανατάσσεται με το χέρι αλλά εύκολα θα εξαρθρωθεί ξανά.

Υπάρχει πλέον λειτουργική αδυναμία εκτέλεσης λειτουργιών από την πλευρά του Κάβαλιερ.

Ο σκύλος πονάει.

Υφίσταται υψηλός κίνδυνος ρήξης χιαστού συνδέσμου στο γόνατο.

Στάδιο 4

Η επιγονατίδα είναι μόνιμα εξαρθρωμένη.

Υφίσταται χρόνιας πόνος και υπαρκτή αναπηρία.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός της κληρονομικότητας μπορεί να υπάρχει και τραυματική αιτία. Συνιστάται η προσεκτική και υπεύθυνη ανάταξη του πρωτοεμφανισθέντος εξαρθήματος, γιατί η κακή επανατοποθέτηση συνήθως οδηγεί σε εκ νέου εξαρθήματα και χρονιότητα της βλάβης.